

הנחיות למיגון עובדים במשק העופות נגד שפעת העופות



ד"ר מיטשל שוואבר
היחידה הארצית למניעת זיהומים
משרד הבריאות

נושאים

- עקרונות ההגנה
- היגיינת ידיים ותברואה
- ציוד מגן
- כניסה לשטח מבודד ויציאה ממנו
- חיסון
- תרופות
- מעקב עובדים שנחשפו

עקרונות ההגנה

- 1. למנוע מגע ישיר בין הנגיף לעובד העופות
- 2. למנוע יציאת הנגיף מחוץ לשטח המבודד
- 3. למנוע הידבקות בנגיף אצל עובדי העופות ע"י מתן תרופות אנטי-ויראליות
- 4. למנוע הידבקות בו-זמנית ע"י נגיף שפעת עופות ונגיף שפעת הומנית ע"י מתן חיסון נגד הנגיפים ההומניים

עקרונות ההגנה

- ההנחיות תחולנה על כל עובד בשטח שיוגדר כמבודד בעקבות מקרה בארץ של שפעת העופות
- קבוצות עובדים:
 - לולנים
 - וטרינרים
 - פקחים
 - נהגים
 - אנשי תברואה

היגיינת ידיים



היגיינת ידיים

על העובד ללבוש כפפות חד-פעמיות למשך כל עבודתו

• עם מים (לידיים שהתלכלכו בטעות)

— הרטבת הידיים, רחצה בסבון
אנטימיקרוביאלי 15 שניות,
שטיפה במים, ואח"כ ניגוב
במגבות נייר חד-פעמיות

• חיטוי בלי מים

— תמיסה המכילה:

- 95% ethanol
- 4% chlorhexidine
- 1% glycerol



כללי תברואה


- על עמדת עבודה להיות מצוידת ב:
 - תכשיר אלוהולי לחיטוי ידיים
 - כפפות תקניות
 - כיור עם סבון אנטימיקרוביאלי
 - מגבות נייר
 - חומר ניקוי/חיטוי משטחים (מכיל כלור בריכוז 1000 ppm)
 - פח זבל



ציוד מגן



- כל כניסה לשטח מבודד תהיה עם ציוד מגן
- המטרה: למנוע מגע עם חומרים מזוהמים
- הפריטים:



- כפפות תקניות
- מסכת N95
- מגן פנים שקוף
- בגדי עבודה
- סרבל מגן
- מגפי גומי

כניסה לשטח מבודד ויציאה ממנו

- בכל אתר עבודה מבודד יוקם אתר הלבשה ובו
 - חדר הלבשה בצד הנקי
 - חדר הלבשה בצד המבודד
 - מקלחת, מצוידת בסבון קוסמטי, המפרידה בין הצדדים

הפשטה והלבשה

כניסה לשטח מבודד ויציאה ממנו

(כל עוד השטח מבודד, שום פריט שנכנס לא יצא.)

אין לאכול בשטח המבודד – קשים וכלי מים יותאמו למסכות)

• כניסה

- להסיר שעונים ותכשיטים
- בחדר הלבשה של הצד הנקי:
 - להתפשט
 - ללבוש בגדי עבודה נקיים אשר יסופקו
 - ללבוש סרבול חד-פעמי
 - לנעול מגפי גומי
 - לשים מסכה, מגן פנים, כפפות

• יציאה

- לשטוף כפפות עם מים
- להסיר מגפים ולנעול נעלי מקלחת
- להסיר סרבול – לזרוק לפח
- להסיר כפפות – לזרוק לפח, לחטא ידיים בתכשיר אלכוהולי
- להסיר מגן פנים ולתלות במקום
- להסיר מסכה – לזרוק לפח
- להסיר בגדי עבודה שסופקו – לכביסה
- חיטוי ידיים חוזר
- מקלחת עם סבון
- להתנגב ולהתלבש



חיסונים

על כל עובד להיות מחוסן נגד נגיפי השפעת ההומניים הרלוונטיים:
- שפעת עונתית
- שפעת H1N1



תרופות

(מדיניות מהתפרצות קודמת של H5N1 - ניתנת לעדכון)

במקרה של היארעות שפעת העופות בארץ,
עובדים יקבלו מידי יום תרופה אנטי-ויראלית

התרופה תיבחר ע"י בדיקות רגישות של הזן המדובר

בהעדר בדיקות רגישות, התרופה תהיה
ממשפחת מעכבי ה-neuraminidase
(כגון, Tamiflu)

מעקב עובדים שנהשפו

- למשך שבוע לאחר החשיפה האחרונה, יש להיות ערניים להופעת:

– חום

– שיעול

– קוצר נשימה

- עובד שמפתח אחד או יותר מסימנים אלה – למיון, לאחר הודעה טלפונית מראש