

# ADAMA

Makhteshim

מכתשים



קוטל עשבים

HRAC  
10+14

סריקה  
לאיתור שימוש



מס' מנה Batch No.	תאריך ייצור Production date

תוקף התכשיר שנתיים מיום הייצור

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים  
ביעילותו, אולם מאחר ואין באפשרותם  
לפקח על השימוש בו, אין הם אחראים  
לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם  
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן אם לפי  
הוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

עדכון תווית: 1/15

## אוקסיפסט®

Oxifast | אוקסיפאסט

תרכיז רחף S.C  
קוטל עשבים כללי

מכיל: 480 גרם בליטר מלח איזופרופיל אמיני של  
Glyphosate, מתאים ל-360 גרם בליטר אקוויולנט-  
חומצה ו-30 גרם בליטר Oxyfluorfen.  
השאר חומרי דילול והרטבה.

**דרגת רעילות: IV - מסוכן**  
**מס' או"ם: לא מסווג**

**לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי**  
**استخدام الزراعي فقط - وليس للاستخدام المنزلي**

**רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת**  
**מס': 11/ה'צ/4119**  
**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

מיוצר ע"י: אגן יצרני כימיקלים בע"מ  
משווק ע"י: אדמה מכתשים בע"מ  
ת"ד 60, באר שבע. המחלקה החקלאית, ק. שדה התעופה  
טל': 03-6577577 .www.adama.com/mcw

## מכיל: 5 ליטר

**ADAMA**  
Makhteshim



## אוקסיפסט® ת.ר. | אוקסיפאסט® | Oxifast® s.c

**כללי:** אוקסיפסט הינו קוטל עשבים משולב סיסטמי לא בררני, בעל פעילות מהירה, המיועד להדברת עשבים קיימים. התכשיר נקלט ע"י העלוה הירוקה ומובל כלפי מטה גם לחלקים התת קרקעיים וגורם לתמותת הצמחים. כדי לקבל הדברה מרבית צריך לרסס על צמחים ירוקים רעננים. פעילות האוקסיפסט מהירה, תוצאות ניתן לראות תוך ימים ספורים מהריסוס. אוקסיפסט מדביר את מרבית העשבים החד-שנתיים הקיימים פרט לקייצת מפותחת ולשישית הצבעים.

### הוראות שימוש:

לקבלת הדברה יעילה של העשבים המנע מהשקיה בהמטרה במשך יומיים לאחר הריסוס. כדי לקבל גם מניעת הצצת עשבים ניתן לשלב עם סימנקס 50 ת.ר. או דיאורקס 80 ת.ר. לפי הגידולים המופיעים בתווית התכשיר המשולב.

בהדברת עשבים בהדרים, במטעים ובגפן אין סכנה מפגיעת התרסיס בגזעי העצים המעוצים.

**אזהרות:** • אוקסיפסט עלול לגרות את העור והעיניים • אין לרסס באוקסיפסט בזמן הפעלת ההשקיה בטפטוף • אין לרסס בתנאי עקה לצמח (חמסין, יובש או קרה). אין לרסס ברוח • גשמים עזים לאחר ריסוס באוקסיפסט עלולים להחדיר את החומר למערכת השורשים ולגרום לנזק לגידול • **אין לרסס אוקסיפסט בחממות ובמבנים סגורים** • מנע הגעת תרסיס או רחף לעלוה ולפירות של גידולי תרבות ולגזעי עצים צעירים שטרם השתעמו, לסורים של עצי פרי ולכל צמחייה רצויה • אוקסיפסט תוקף מתכות למעט פלדת אל-חלד, השתמש רק במרססים בעלי מיכלים העשויים מחומרים סינתטיים או מפלדת אל-חלד.

**אמצעי זהירות ומיגון:** • בעת הטיפול בתכשיר המרוכז לבש בגדי מגן, כפפות גומי ומשקפי מגן, הימנע מלנשום אדי התכשיר • בעת הריסוס לבש בגדים שיכסו את כל חלקי הגוף • אל תאכל ואל תעשן בעת השימוש בתכשיר.

**סכנות לסביבה:** החומר מסוכן לייצורים שוכני מים, הימנע מרחף לבריכות דגים.

## הוראות השימוש

לקבלת הדברה יעילה המנע מהשקיה בהמטרה במשך יומיים לאחר הריסוס. גשם היורד תוך שש שעות לאחר הריסוס מפחית מעילות הטיפול. לאחר ריסוס עשבים רב-שנתיים צריך להימנע מעיבוד הקרקע או כניסת בעלי חיים והאבסתם לפחות 7 ימים. אבק, המכסה את העשבים מפחית מעילות הריסוס. עיבוד הקרקע או הכנסת בעלי חיים לשטח והאבסתם תוך 7 ימים מהריסוס עלול לפגוע ביעילות הטיפול.

**אופן הכנת התרסיס:** בריסוס באוקסיפסט בלבד: מלא תחילה את המרסס בכמות המים הדרושה, הפעל את המערבל ושפוך את כמות האוקסיפסט הדרושה למיכל המרסס. בריסוס באוקסיפסט במשולב עם קוטלי עשבים אחרים: מלא תחילה במיכל המרסס את מחצית כמות המים הדרושה, הוסף תחילה את קוטל העשבים הנוסף, אחר כך השלם מילוי המים ולבסוף את האוקסיפסט תוך ערבול מתמיד.

**הציוד וכיול:** ריסוס מהקרקע: משתמשים במרסס המצויד במוט ריסוס (לא במפוח) עם פומיות קונית ("קון ז'ט") x3 עד x6 בהתאם לנפח התרסיס הרצוי. לריסוס אוקסיפסט עם קוטל עשבים שאריתי משתמשים בפומיות מניפה (טי-ג'ט). המסננים במערכת ובפומיות יהיו של 50 מ"מ. צריך לכייל את המרסס לפני הריסוס לקבלת המינון ונפח התרסיס הרצוי. מרססים בלחץ נמוך של 20-30 ליברות לאינטש מרובע, למניעת רחף רסס רק בשעות ללא רוח.

**נפח התרסיס:** 15-25 ליטר לדונם.  
**טבלת השימוש**

הגידול	העשבים המודברים	המינון (סמ"ק/ד')	הערות
הכנת שטחים לפני זריעה או שתילה של כותנה, אבטיח, חמניות, עגבניות לתעשייה. (בעגבניות ניתן לרסס עד שבועיים לפני השתילה).	חד-שנתיים עד גובה 40 ס"מ	200	לפני הזריעה או לאחריה וכן לקראת שתילה. אין לרסס לאחר השקייית ההנבטה. <b>אין לרסס בקרקעות חוליות המכילות פחות מ-10% חרסית.</b>
בעצי פרי מגיל שנה ואילך: הדרים, אבוקדו, פקאן, תפוח, אגס, חבוש, משמש, אפרסק, נקטרינה, שזיף, גודגון, מנגו, גפן, זית, שסק, אפרסמון, קיווי, תמר, אנונה, גואיבה.	חד-שנתיים עד גובה 40 ס"מ	300-200	למניעת הצצה של עשבים ח"ש ניתן לשלב סימנקס* ת.ר. לפי הגידולים המורשים.
צדי דרכים, סביב מבנים ולאורך קווי מים	חד-שנתיים עד גובה 40 ס"מ	300-200	למניעת הצצה של עשבים ח"ש ניתן לשלב סימנקס* ת.ר.

\* להפעלת הסימנקס דרוש גשם או המטרה תוך 3-2 שבועות לאחר הריסוס.

## בגמר השימוש

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, ממכל האיסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בגמר הריסוס:** רחץ במים ובסבון את כל חלקי הגוף שבאו במגע עם החומר. כבס בגדי עבודה בנפרד.

**מועד כניסה מחדש לשטח המרסס:** לאחר התייבשות התרסיס.

**אחסון:** אחסן את התכשיר במחסן או ארון נעול, מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. אין לאחסן את התכשיר עם מצרכי מזון לאדם ולחיה. שמור את החומר באריזה המקורית.

**חומר שנשפך:** צריך לשפוך עליו חול כדי לספוג, לאסוף לכלי אטום ואחר כך להעביר לאתר פסולת רעילה.

**טיפול באריזות ריקות:** את האריזות הריקות צריך לשטוף 3 פעמים במים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמיכל המרסס אחר כך נקב, מעך והשלך למכל האשפה.

## עזרה ראשונה:

- במקרה מגע בעור רחץ היטב במים.
- במקרה שניתן חומר לעיניים שטוף במשך 15 דקות במים זורמים והבדק אצל רופא.

**מידע לרופא:** מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה: 04-8541900

