



5L net

תصنيف: IV خطر
رقم: UN 3082

מבید פטרי

סיווג: IV מסוכן
מס' או"ם: 3082

תכשיר להדברת מחוללי מחלות בצמחים

מכיל: 300 גר/ל Pyrimethanil

יحتוי על: 300 גמ/ל Pyrimethanil



اقرأ اللاصقة بتمعن قبل الاستعمال وتأكد من التطبيق حسبها فقط.
קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה

נדר היטב לפני השימוש / חזר הבועה قبل الإستعمال

רשיון השירותים להגנת הצומח: 04 / הצ / 1337
תריח צמח / שירותי לוחמת הצומח / 04 / ו / 1337

לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי

לإستعمال الزراعي فقط وليس للإستعمال הביתי



Bayer



מס' אצווה: _____ ליזור כימיקלים בע"מ, רמת השרון 4710002. טל: 03-7606222

עודכן: 05/2018 R

מאי מכירה: אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האידיה ומתאים למטרות המצוהות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנמדדת את ההוראות המציינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לציפייה על ידם. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו.

אתלף העיבות: אגסל העיבות الفارغة ٣ مرات وافرغ ماء الشطف لداخل وعاء المرش وبعدا يجب تمزيق ورصع العيבות والقائها داخل حاويات القمامة المعدة لذلك.

اسعاف اولي: في حالة التسمم يجب استلقاء المصاب في مكان مظلل وبالهدوء الطلق واستدعاء الطبيب حالاً واحضار تفاصيل المبيد للطبيب.

علامات التسمم: يمكن حدوث غثيان، تقيء، واوجاع بطن، في حالة تلووث العينين يجب غسلها بالماء لمدة ١٥ دقيقة وغسل الاعضاء بالماء والصابون جيداً.

شروط البيع:

نحن مسؤولين بان هذا المستحضر مطابق للوصفة الكيماوية التي تظهر على العبوة. وهذا بشرط ان طريقة استعماله مطابقة للتعليمات والاهداف المرفقة وكذلك بطروف استعمال مقبولة لسنا مسؤولين عن الاستعمال الخالف للتعليمات المثبتة على العبوة أو طرق غير ملائمة للاستعمال الصحيح أو غير متوقعة في حالات كهذه تقع المسؤولية على المشتري فقط واننا غير مسؤولين عن كل نتيجة أخرى كانت مباشرة أو غير مباشرة.

تحضير محلول المرش:

تخلط الكمية المطلوبة من المستحضر مع الماء وتسكب داخل وعاء المرش المملوء حتى ثلثه بالماء وتضاف كمية الماء المتبقية مع الحفاظ على الخلط المتواصل وفي كل الاحوال عند خلط مادة أخرى يجب اضافتها في الثلث الثاني لكمية الماء في وعاء المرش.

تعليمات وقائية بعد الاستعمال:

تنظيف معدات الرش: يجب غسل معدات الرش بعد الاستعمال. والاهتمام بان مياه الغسيل لا تجري الى الحقول المزروعة ومصادر المياه وبرك السمك.

منوع التسبب لتفريغ او غسيل المواد وبقيائها الى مصادر المياه بطريقة مباشرة او غير مباشرة كانت. واذا كان حجم المرش اعلى من ١٥٠ لتر لا يمكن غسله او تفريغه الا في مكان مخصص لذلك.

الوقاية بعد الاستعمال: يجب غسل الايدي وجميع اعضاء الجسم التي لامسة المحلول واستبدال ملابس المرش وغسلهما لوحدهما بمواد التنظيف.

الدخول للحقل المرشوش: بعد جفاف المحلول وارتداء ملابس واقية لكل اعضاء الجسم.

التخزين: يجب حفظ وتخزين المستحضر بعبوته الاصلية في مخزن مغلق المعد لتخزين المبيدات بعيداً عن متناول ايدي الاطفال والاشخاص الغير مؤهلين وارجاع المبيد المتبقى للمخزن بعد الاستعمال.

المادة المسكوبة:

يجب نثر رمل او جارة على المادة المسكوبة وجمعها بوعاء مغلق ونقله لموقع النفايات السامة.

مستحضر لمكافحة الامراض الفطرية والتعفنبة بالمحاصيل الزراعية.

عام: ميتوس مستحضر لمكافحة الامراض التعفنبة. يجب الابتداء بالرش عند بداية الاصابة بالبوترتس.

العناية والرش. تستمر كل الفترة المتوفرة فيها الظروف المناخية للإصابة بالبوترتس وايضاً حسب تعليمات الرش المتبعة بالتبادل مع مواد اخرى وذلك لتفادي المناعة.

تعليمات الاستعمال:

تحذير: المستحضر يسبب تهيج في العيون.

وسائل الحذر: يجب استعماله بموجب قواعد الحذر المتبعة عند استعمال المبيدات. استعمال لباس كامل لكل الجسم. قفازات. كمامة. نظارات واقية اثناء الرش. واحذر من استنشاق وابتلاع المستحضر ومن ملامسته المباشرة لاعضاء الجسم. ممنوع الاكل الشرب والتدخين اثناء الاستعمال.

تأثيرات بيئية: المستحضر سام للسمك وللكائنات المائية.

قابلية الخلط:

يمكن خلطه مع المبيدات التالية: بالخيار والبندورة، داينون، مانسيدان، كوتسايد، اوفير، فبرتيمك.

بالتوت الارضي: اوفير، سنسور، فبرتيمك.

بالعنب: دورسيبان، دفي بان. بايترونييد وعدم خلطه مع مواد أخرى بدون استشاره.

מיטוס מסתכר لمكافحة الأمراض الفطرية والتعفنية بالمحاصيل الزراعية.

כללי: התחל לרסס עם הופעת נגיעות בבוטריטים. הריסוסים ימשכו כל עוד שוררים תנאי אקלים המתאימים לפעילות הבוטריטים ובהתאם להנחיות בסעיף מדיניות ריסוסים למניעת התפתחות תנגודת. הריסוסים ינתנו בצורה שתבטיח כיסוי מלא של נוף הצמחים.

הוראות שימוש:

אזהרות: מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: יש לטפל ולהשתמש בחומר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה. יש להקפיד על בגדי עבודה ארוכים, סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי והגנה על השיער. להשתמש בכפפות ניטריל (לפי תקן EN-374/3) ומשקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166). יש להקפיד על שימוש במסכת חצי פנים (תקן EN-140) עם מסנן משולב (תקן EN-14387) מסוג ABEK-P3. יש להימנע מבליעת התכשיר ושיאפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

סכנות לסיביבה: מזיק ליצורים השוכנים בסביבה מימית, עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אינו רעיל לדבורים.

הכנת התרסיס:

- ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים ומפעילים את המערבל.
- שמים את הכמות הדרושה של התכשיר לתוך המסננת שבפתח המיכל.
- שוטפים את התכשיר לתוך המיכל על ידי הוספת יתרת המים. אין להפסיק את פעולת מערכת הערבול מעת המילוי ועד גמר הריסוס.

מדיניות ריסוסים למניעת התפתחות תנגודת: אין לטפל במיתוס יותר מ-3 ריסוסים בעונה. בגידולים בהם מקובלים טיפולים רציפים להדברת בוטריטים יש לשלב מיתוס בתוכנית הטיפול. אין לטפל במיתוס ברציפות; לאחר טיפול במיתוס ינתנו שני טיפולים בתכשירים אחרים להדברת בוטריטים, אשר להם ממנגנון פעולה שונה.

אופן היישום:

הגידול	המחלה	מינון לדונם (סמ"ק/ד, %)	נפח התרסיס ליטר/ד'	ריסוס אחרון לפני קטיף (ימים)
מלפפון	בוטריטים	250	40-100 ליטר/ד'	3
		0.25%	מעל 100 ליטר/ד'	
		250	25-60 ליטר/ד'	
בצל	בוטריטים אספרגיליס פוזריום	250	100 ליטר לדונם ויותר	-
גפן	בוטריטים אספרגיליס	0.25%	100-150 ליטר/ד'	14
		250	25-60 ליטר/ד'	21
תבלינים: בזיל, מרווה, מנטה, קורנית, רוזמרין, אורגנו, מיורם, טרגון.	בוטריטים	250	25-60 ליטר/ד'	21
		250	25-60 ליטר/ד'	7

***מאושר לזנים:**

ורד: אירופה, יגואר, מרצדס, פריסקו, פרופיטה, גברילה, פברוטי, קונפטי, רוול, ברקארול, פירסטרד, אוסיאנה, למבדה, אסקימו. **ליזיאנטוס:** ויולט, פיור וויט.

אסטר: סאן קרלו.

ציפורן: אטור, קווין למבדה, סרג'יו אדום, דלפי לבן, מרידונה צהוב, צ'או בונקו, באצ'ו, אורנג' מג'יק.

שושן: מג'יק בלנש.

פרח שעווה: פטיקוט, סגול, אורכיז, סנופלקט.

לימונים: לבנדר ורוד.

שילובים:

בגידולים הבאים ניתן לשלב מיתוס עם התכשירים המפורטים להלן בכפוף לתוויות שלהם:

בצל (זנים: מיקדו, אדום ואורלנדו 686): מובנטו 100.

מלפפון: דיינון, מנצ'דן, קוצ'יד 101, אופיר, ורטימק.

עגבנייה: מנצ'דן, קוצ'יד 101, אופיר, ורטימק.

תות שדה: אופיר, סנסור, ורטימק.

גפן (סופרייר, סולטנינה): דורסן, סימבוס.

בהעדר מידע נוסף אין לשלב תכשיר זה עם תכשירים אחרים.

בגמר השימוש:

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריה בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשתוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשתוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממילק איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה: במקרה של מגע יש לרחוץ היטב את המקום עם מים וסבון. עם גמר הטיפול, יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.

כניסה מחדש לשטח: עם התייבשות התרסיס מותר להיכנס מחדש לשטח. בבתי צמיחה ובמנהרות עבירות יש לאוורר 12 שעות נוספות בשיטות המקובלות לפני כניסה מחדש ללא ציוד מגן אישי.

איחסון: לאחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.

טיפול בחומר שנשפך: חומר שנשפך, יש לאסוף לתוך כלי אטום ולהעבירו לאתר הפסולת הרעילה.

טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטוף אל מיכל המרסס, נקב ומערך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

עזרה ראשונה: במקרה של חשד להרעלה, הוצא את הנפגע לאוויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מיידית ע"י רופא, והצג בפניו תווית זו. במקרה של **בליעה** יש לפנות הנפגע לרופא. במקרה של **זיהום בעיניים**, יש לשתוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום **העור**, רחץ במים וסבון את המקום שנפגע.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם, טלפון מס' 04-7771900.

מعلومات للطبيب: مركز المعلومات في حالة التسمم ت: ٠٤-٧٧٧١٩٠٠

תعليمات الاستعمال:

المحصول	الأفة	المقادير للدونم سم/٣ د. %	حجم الرش لتر/دونم	الموعد الأخير للرش قبل القطف
خيار بندورة	عفن رمادي بوتريتييس	250	100-40 لتر/دونم	3 أيام
		0.25 %	أكثر من 100 لتر للدونم	
بصل	بوتريتييس اسبرغيلوس فوزاريوم	250	60-25 لتر/دونم	3 أيام
ورود* ليزيانتوس* استر*. قرنفل. عدعاد. غونديسيا. خطمية. ليمونيوم. أزهار شمعية*. شوشان*	بوتريتييس	0.25 %	أكثر من 100 لتر للدونم	-
كروم العنب	بوتريتييس اسبرغيلوس	0.25 %	150-100 لتر/دونم	14 يوماً
توابل: ريحان. مرمية. نعناع. زعتر فارسي. روزمارين. اورجانو. مردقوش. طرخون.	بوتريتييس	250	60-25 لتر/دونم	21 يوماً
توابل: شمير (شومر). كسيرا. بقدونس	بوتريتييس	250	60-25 لتر/دونم	7 أيام

ملاحظات:

* في الورد مسموح بالأصناف التالية: أوروبا. ياغوار. مارسيدس. باريسكو. فروفيتا. فابروتی. كونفاتي. دول. اوسيانا. لامبادا. اسكيמו. ليزيانتوس: فيوليت. فيوروايت. استر: سان كارلو. قرنفل. أطور. كوين لامبادا. سارجيو احمر. دلفي ابيض. ماريدونا اصفر. اوراخ ماجيك. شو شان. ماجيك. ازهار شمعية: باتيكوت بنفسجي. اوركيد.