

דרגת רעילות: מסוכן (IV)
מספר או"ם: לא נקבע

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי
ليس للاستعمال البيتي

רשיון השרותים להגנת הצומח:
1801/ה.צ./05

מספר אצווה:

מכיל: 0.5 ליטר



אחים מילצ'ן בע"מ

המשרד: רח' ביאליק 155 רמת-גן
טל' 03-7518103, פקס' 03-5768200
המחסן: רח' מבוא הספינים, אשדוד
טל' 08-8527124, פקס' 08-8533844

fine
היצרן: Fine Agrochemicals Limited אנגליה



סופרלון

سوبرلون

תרכיז נוזלי

מכיל: 19.0 ג'ל' Gibberellins GA₄₊₇
19.0 ג'ל' 6-Benzyladenine

מווסת צמיחה

מיועד להפחתת חיספוס בתפוח מזן זהוב,
להגדלת פרי באגס וכן לסיעוף ענפונים בדובדבן



עודכן 4.06

פסקת אחריות: המשתמש נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.

אין ליישם סופרלון לאחר גשם לפני התייבשות הנוף. גשם שירד 6 שעות לאחר היישום לא יפגע ביעילות הטיפול. רצוי ליישם את התכשיר כאשר לחות האויר גבוהה וזאת בכדי לאפשר קליטה מירבית. מומלץ לרסס בשעות הבוקר או הערב. אין ליישם סופרלון על עצים המצויים בתנאי עקה כלשהי. מנע רחף של התרסיס לשדות ולגידולי תרבות שכנים.

הכנת התרסיס: מלא את מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה. הפעל את העירבול והוסף את הכמות הדרושה של הסופרלון וכן את המשטח למיכל המרסס. השלם את יתרת המים. הקפד על ערבול מתמיד במהלך הישימה. בתמיסה המוכנה יש להשתמש בתוך 24 שעות ממועד הכנתה.

בגודגן לסיעוף ענפונים - יש למרוח את התמיסה באמצעות מברשת או בריסוס על הציר המרכזי של העץ וכן על הזרועות המרכזיות.

הכנת התמיסה: יש למהול את התכשיר במים ביחס של 4:1. בתוספת דבק בריכוז 0.1%.

כללי: סופרלון הינו מווסת צמיחה המיועד להפחתת חיספוס בתפוח מהזן זהוב להגדלת פרי באגס מהזן ספדונה ולסיעוף ענפונים בדובדבן. מרכיב הג'יברלין בתכשיר מרביתו GA₄ אשר לו עיקר הפעילות ואילו כמות ה-GA₇ זניחה.

אזהרות: עלול לגרום גרוי בעור ובעיניים. מסוכן בבליעה. **אמצעי זהירות ומיגון:** בעת הטיפול בתכשיר לבש כפפות גומי, משקפי מגן, מסיכה וסרבל עם שרוולים ומכנסיים ארוכים. מנע מגע של התכשיר המרוכז או התרסיס עם העור והעיניים. אל תשאף את אדי התכשיר. אסור לאכול, לשתות או לעשן במהלך העבודה עם התכשיר.

רעילות לדבורים ולדגים: התכשיר אינו רעיל לדבורים ולדגים.

הוראות שימוש:

בתפוח להפחתת חיספוס או באגס להגדלת פרי - סופרלון ניתן ליישמה בכלי הריסוס המומלצים לשימוש במטע. יש לרסס בטיפות קטנות ולהגיע להרטבה מלאה ללא נגירה. אין ליישם סופרלון בטמפרטורות נמוכות מ-7 מ"צ או גבוהות מ-32 מ"צ.

אופן היישום:

גידול	המטרה	אופן ומועד היישום	ריכוז או מינון	נפח התרסיס
תפוח מזן זהוב	הפחתת חיספוס פרי	ריסוס הנוף החל מתחילת נשירת עלי כותרת. ינתנו 4 ריסוסים עוקבים במרווח של 7-10 ימים.	0.025% או 25 סמ"ק/ד'1 יש לשלב משטח טריטון X-100 בריכוז 0.025%	100 ל"ד/ד'2
אגס מזן ספדונה	הגדלת פרי ³	ריסוס הנוף 14 יום לאחר שיא פריחה. קוטר חנטים: 8-10 מ"מ	0.125% יש לשלב משטח טריטון X-100 בריכוז 0.025%	100-120 ל"ד' בהתאם לגודל העץ, לכיסוי מלא של הנוף ללא נגירה.
גודגן מהזנים: רנייר, צ'ינוק, לאפינס, סטלה, בינג	סיעוף ענפוני פרי ועיצוב העץ	מריחה במברשת או בריסוס עם תחילת תפיחת הפקעים, על הציר המרכזי של העץ ועל הזרועות המרכזיות	100 סמ"ק תכשיר מדולל ב-400 סמ"ק מים בתוספת דבק 1% מנפח התמיסה	—

1. אם מרססים בנפח תרסיס נמוך מ-100 ל"ד' יש לרסס במינון 25 סמ"ק/ד'.
2. אין לרסס בנפח תרסיס מעל 100 ל"ד' או נמוך מ-50 ל"ד'.
3. הטיפול גורם לעיתים לפרי מאורך ומצולע מעט.

שילובים: בתפוח ובאגס יש לשלב סופרלון עם משטח טריטון X-100. בהעדר מידע אין לשלב סופרלון בתכשירים אחרים.

בגמר השימוש

שטיפת המרסס:

בגמר הריסוס יש לשטוף את המרסס על כל אביזריו במים עם דטרגנט. מתקן ריסוס שנפחו עולה על 150 ליטר שטוף במתקן שטיפה בלבד. הקפד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים, בריכות דגים ומקורות מים.

הגנה אישית בגמר העבודה: מיד בגמר הריסוס יש להתקלח במים ובסבון ולהחליף את כל הבגדים. בגדי ריסוס מזהמים יש לכבס בנפרד משאר הכבסים.

מועד כניסה מחדש לשטח המטופל: 12 שעות.

אחסון: שמור את התכשיר סגור באריזתו המקורית, במקום קריר מוגן ונעול המיועד לאחסון תכשירי הדברה.

הרחק ממגע ידם של ילדים ואנשים לא מוסמכים. מנע מגע של התכשיר עם חומרי מזון או מספוא.

תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לכסות בחול או בנסורת, לאספו לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

השמדת אריזות ריקות: אריזה שהתרוקנה, שטוף היטב לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיף אל מיכל הריסוס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל אשפה או לאתר פסולת רעילה.

- במקרה של **בליעה**: אין לגרום להקאה, יש לשתות כמות גדולה של חלב או מים ולפנות מיד לרופא.
- במקרה של מגע **בעור**: יש להסיר בגדים מלוכלכים ולרחוץ את איברי הגוף שהזדהמו במים ובסבון.
- **מידע לרופא**: במרכז ארצי ליועץ רפואי בהרעלות, בי"ח רמב"ם, חיפה. טל': 04-8541900.

עזרה ראשונה

- במקרה של שאיפת אדי התכשיר או התרסיס יש להעביר את האדם הנפגע לאזור מאוורר. במקרה של חשד להרעלה יש לפנות לרופא.
- במקרה של מגע **בעיניים**: יש לשטוף את העיניים במים נקיים למשך 10 דקות לפחות.

דרגת רעילות: מסוכן (IV)
מספר א"ם: לא נקבע

קרא בעיון את התווית לפני השימוש

לא לשימוש ביתי
ليس للاستعمال البيتي

רשיון השרותים להגנת הצומח:
1801/ה.צ./05

מספר אצווה:

מכיל: 0.5 ליטר

אחים מילצ'ן בע"מ

המשרד: רח' ביאליק 155 רמת-גן
טל' 03-5768200, פקס' 03-7518103
המחסן: רח' מבוא הספינים, אשדוד
טל' 08-8533844, פקס' 08-8527124

fine
היצרן: Fine Agrochemicals Limited אנגליה

 **SUPERLON** (PERLAN) **סופרלון**
سوبرلون

תרכיז נוזלי

מכיל: 19.0 ג'ל' Gibberellins GA₄₊₇
19.0 ג'ל' 6-Benzyladenine

מוסת צמיחה

מיועד להפחתת חיספוס בתפוח מזן זהוב,
להגדלת פרי באגס וכן לסיעוף ענפונים בדובדבן

עודכן 4.06



פסקת אחריות: המשתמש

נושא באחריות לכל הנזקים הנובעים מגורמים ומתנאים שאינם בשליטת היצרן. היצרן אינו אחראי לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מתנאי אחסון לא מתאימים או כתוצאה משימוש לא נכון בתכשיר.