



**ADAMA**  
Agan

# מוספילן לריסוס

Mospilan for spraying

موسبيلان للرش

תרכיז נוזלי

ACETAMIPRID 200 g/L

השאר חומרי דילול והרטבה

תכשיר סיסטמי להדברת מזיקים  
בגידולים שונים

קבוצת IRAC 4A

מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1835/הגה"צ/2005  
לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!

للاستعمال الزراعي فقط - وليس للاستعمال المنزلي!

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמבי"ם 04-8541900

קרא את התווית לפני השימוש | מספר אצווה מודפס על גבי האריזה

ייצור ושיווק: אדמה-אגן בע"מ

אשדוד 77102, ת.ד. 262, טל. 08-8515211

[www.adama.com/agan](http://www.adama.com/agan)

**1 ליטר**

עידכון 7/16 S0656-11



סרוק לכניסה  
לאתר



## טיפול באריזות ריקות:

את האריזות הריקות צריך לשטוף 3 פעמים במים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס שבמיכל המרסס. אחר כך נקב, מעך והשלך למכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

## עזרה ראשונה:

אם חדר חומר לעיניים - שטוף אותן מיד בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא.

במקרה של מגע בעור - שטוף מיד במים וסבון.

במקרה של בליעה פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תוויית זו.

## מידע לרופא:

המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמבי"ם **04-8541900**

תנאי מכירה: היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

## בגמר הריסוס

**ניקוי המרסס:** יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

## אחסון:

אחסן התכשיר במקום נעול, מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים.

זהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון, מספוא, זרעים ותכשירי הדברה אחרים.

שמור את החומר באריזה המקורית סגורה היטב.

## הגנה אישית:

רחץ במים וסבון חלקי גוף שנחשפו לחומר.

בתום העבודה התרחץ והחלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו. כבס בגדי עבודה בנפרד.

**מועד כניסה לשטח המרוסס:** לאחר התייבשות התרסיס.

## חומר שנשפך:

יש לכסות בחול כדי לספגו ואחר כך לאסוף לאריזה אטומה ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

## הערות לטבלה

\* מוספילן ת.ג. נבדק באסתר בזן "קזבלנקה", בגיפסנית בזן "מיליון סטאר", בהיפריקום בזן "פינק פלייר", בורד בזנים "יופיטר" ו"סוויט אקיוטי", בליזיאנטוס בזן "קאלו לבן", בסולידגו בזן "טרה", בפיטוספורום בזן "מגוון".

בכל הגידולים צריך לבדוק בטיחות השימוש בזנים שאינם מצוינים כאן על מספר מצומם של צמחים לפני הריסוס המסחרי.

\*\* מוספילן פוגע בחיפושית הרודוליה שטרופת את כנימת האיצריה ועלול להביא להתפרצות מזיק זה.

## שילובים

פירוט השילובים הבטוחים עם מוספילן בגידולים השונים:

**אבטיח** - סיגנום, סטרובי, שמן וירול

**קישוא** - סיגנום, שמן וירול

**מלפפון** - ספיידר

**מלון** - סיגנום, סטרובי, שמן וירול

**פלפל** - סיגנום

**חציל** - סיגנום

**עגבניות** - ספיידר, סיגנום

**הדרים** - חנקת אשלגן, גופרת מנגן, תחמוצת אבץ, אוריאה דלת ביורט.

(בריכוזים המומלצים ע"י ש.ה.מ.)

**גפן** - סיגנום

**כותנה** - סיגנום, טיטאן, אטברון, פיקס

**בזיליקום, מנתה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, כוסברה, שמיר,**

**פטרוזיליה, רוקולה** - סיגנום

לפני ריסוס בכל שילוב בדוק לבטיחות על מספר מצומצם של צמחים.

**כללי:**

מוספילן הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורוניקוטיניל, מיועד להדברת מזיקים שונים. התכשיר פועל כרעל קיבה ומגע. לתכשיר רעילות נמוכה יחסית לבעלי דם חם.

אין לרסס צמחים בעקה. אין לרסס בתנאים קיצוניים (חמסין, קרה וכדומה).

**דרכים למניעת פיתוח תנגודת:**

כדי למנוע התפתחות תנגודת לתכשיר, יש לרסס חליפות בתכשיר זה ותכשירים בעלי מנגנון פעולה אחר.

**אזהרות:** התכשיר הינו מגרה חריף לעיניים, מגע התכשיר בעיניים עלול לגרום לבזק חמור. החומר מסוכן בבליעה.

**אמצעי זהירות ומיגון:**

הימנע מבליעה ושאיפת התכשיר וממגע ישיר בעור ובעיניים.

לבש כפפות גומי, משקפי מגן וסרבול מלא (כולל כיסוי ראש) בעת הטיפול בתכשיר המרוכז. בעת הריסוס לבש בגדי עבודה מלאים וסגורים וכפפות גומי. אל תאכל, אל תשתה ואל תעשן בזמן העבודה.

**רעילות לדבורים ולדבורי בומבוס:**

אסור לרסס ישירות על הדבורים והכוורות.

מומלץ לסגור את הכוורות לקראת ערב ולרסס כאשר הדבורים לא פעילות בשטח. 24 שעות לאחר הריסוס אין פגיעה בדבורים. 30 שעות לאחר הריסוס אין פגיעה בדבורי בומבוס.

**ציוד הריסוס:**

ניתן להשתמש בכל מרסס המתאים לריסוס קוטלי חרקים בנפח התרסיס הדרוש, בהתאם לגודל. בכותנה ניתן לרסס מהאויר.

**הכנת התרסיס:**

מלא את מכל המרסס כדי מחציתו במים. הכנס את כמות המוספילן הדרושה. המשך למלא את המכל תוך כדי בחישה.

**טבלת השימוש:**

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד') או %	נפח תרסיס (ל'/ד')	הערות	מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים
כותנה	כנימת עש הטבק	40 ריסוס אוויר 25 ריסוס קרקע	3-5 7-20	הריסוס עם יינתן עם הופעת זחלים ראשונים בעלים.	30
	אבטיח, מלפפון, דלורית	כנימת עלה הדלועיים	20	50-30 לפי גודל הצמחים	7
עגבנייה, פלפל, חציל, אבטיח, מלון, מלפפון, קישוא	כנימת עש הטבק	30	50-30 לפי גודל הצמחים	7	7
	בזיליקום (ריחן), מנתה, מרווה, קורנית, רוזמרין, טרגון, מיורם	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עש הטבק	30	50-30 לפי גודל הצמחים	14
כוסברה, שמיר, פטרוזיליה, סלרי, בצל ירוק, רוקלה, עשב לימון	כנימת עלה הדלועיים, כנימת עש הטבק	30	50-30 לפי גודל הצמחים	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	7
	עש תפוח, ציקדה, רדנית, עש שלפוחיות עלה האגס (לאוקוסטרה), ליטוקוליטיס, סס הנמר, פרלטוריה	עש תפוח	אנס	עש תפוח	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות
רימון, שקד	כנימת עלה הדלועיים, ציקדות	15	50-30 לפי גודל הצמחים	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	10
אפרסמון	כנימת השעווה הפלורידית, תריפס סורי, ציקדות	0.025% (25 סמ"ק ל-100 מים)	120-250 לפי גודל העצים	בכנימת השעווה הפלורידית הריסוס יינתן עם הופעת הזחלנים	52

מוספילן לריסוס موسפילן סאטל ללרש MOSPILAN for Spraying

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד') או %	נפח תרסיס (ל'/ד')	הערות	מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים
הדרים**	עש המנהרות של ההדר	0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	הרטבה מלאה	הריסוס יינתן עם הופעת זחלי העש הראשונים של המזיק בעלים.	120
	כנימת הפסיראה, כנימת עלה הדלועיים	0.015% (15 סמ"ק ל-100 ליטר מים)			
	כנימה קמחית כדורית, כנימה קמחית חבויה	0.075% (75 סמ"ק ל-100 ליטר מים)		הריסוס יינתן לאחר החנטה בראשית הקיץ	
כנימה אדומה	כנימת השעווה הפלורידית	0.025% (25 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	300-400 במפוח	מועד הריסוס עם תחילת הנגיעות באגביב-קייץ מוקדם	
	כנימת עלה התפוח	0.05% (50 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	150-200 לפי גודל העצים	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	45
אנס	עש תפוח, ציקדה, רדנית, עש שלפוחיות עלה האגס (לאוקוסטרה), ליטוקוליטיס, סס הנמר, פרלטוריה	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)		מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	45
	עש תפוח	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)			
רימון, שקד	כנימת עלה הדלועיים, ציקדות	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	150-100 לפי גודל העצים	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	15
שקד	אנרסיה	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	150-200 לפי גודל העצים	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	15

מוספילן לריסוס موسפילן סאטל ללרש MOSPILAN for Spraying

הגידול	המזיק	המינון (סמ"ק/ד') או %	נפח תרסיס (ל'/ד')	הערות	מועד אחרון לטיפול לפני קטיף בימים
משמש, שזיף	חיפושית הקליפה, אנרסיה	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	150-200 לפי גודל העצים	מועד הריסוס - עם תחילת הנגיעות	30
אפרסק/נקטרינה	אנרסיה	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	150-200 לפי גודל העצים	אם קיימת נוכחות אקרויות במטע, אקרויות	30
	ציקדות	0.04% (40 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	150-100 לפי גודל העצים	הריסוס במוספילן עלול במקרים מסוימים לעודד אותן.	30
גפן	ציקדות	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	100-150 לפי גודל הגפנים		45
זית	זבוב הזית	0.02% (20 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	200-100 לפי גודל העצים	ריסוס אחד לעונה	20
דקל קנרי	חזקנית הדקל האדומה (Rhynchophorus ferrugineus)	0.2% (200 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	15 ל' /עץ	הטיפול יינתן אחת ל-6 חודשים לכותרת הדקל ב-3 נקודות, במרחק שווה ביניהן, קרוב ככל האפשר ללולבים. השתמש במרסס ללא דיזה. הקפד שלא יהיה נגר של התרסיס על הגזע.	-
	אסתר * גפסנית * היפריקום * ורד * ליזיאנטוס * סולידג * פיטוספורום * רוסקוס	30 ----- 0.03% (30 סמ"ק ל-100 ליטר מים)	30-60 ----- 0.03% (הרטבה מלאה)	ראה סעיף הערות לטבלה	-

(ראה הערות לטבלה)

מוספילן לריסוס موسפילן סאטל ללרש MOSPILAN for Spraying