

מוסתי צמיחה
GROWTH
REGULATOR



List No. 11815-16-01 04-8920/R3

כללי: מקסל הינו הורמון צמחי על בסיס ציטוקינין לדילול והגדלת פרי בתפוח ולהגדלת פרי באגס. מקסל מיושם במועד של 10-14 יום לאחר שיא פריחה. במועד יישום זה מתקבל האפקט של הגדלת פרי באגס ובתפוח ודילול פרי בתפוח.

דרגת רעילות: מסוכן (IV). מס' אר"ם: לא מסווג
רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 1894/הצ/07
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

Lot No.:

מיוצר ע"י SBM, צרפת/A To Z, ארה"ב
עבור VALENT BioSciences, ארה"ב

Date of Mfg.:

בעל הרשיון והמשווק: כצט בע"מ
משרד ראשי: החרש 4, הוד השרון, 45240
טל. 09-7626372, פקס. 09-7626327

 VALENT BioSciences.® registered trademarks of Valent BioSciences Corporation, USA.
870 Technology Way
Liberty, MO 64068 U.S.A.
Phone: 1-402-998-0700

Agrica
כצט CTS

מנע מגע של ילדים עם התכשיר
تجنب لمس الأطفال للمنتج
לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי
ليس للاستعمال البيتي

5 ליטר

תרכיז נוזלי
Soluble Liquid

מכיל: 19 גרם בליטר בנוזל-אדנין
(6-Benzyl-Adenine)

הורמון צמחי לדילול
פרי והגדלתו בתפוח,
ולהגדלת פרי באגס

מקסל ת"ב


PLANT GROWTH REGULATOR

ماكسيل



אזהרות:

- מזיק בבליעה
- עלול לגרום גירוי עיניים ועור.

אמצעי זהירות ומיגון:

- יש לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנהוגים בשימוש בתכשירי הדברה.
- מנע בליעה ושאיפת אדי התכשיר המרוכז או רחף התרסיס.
- מנע מגע התכשיר עם העור והבגדים. יש חובת שימוש בבגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים וגם נעלי עבודה סגורות, וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער.
- יש להשתמש בכפפות מסוג ניטריל לפי תקן (EN-374/3).
- נדרש להשתמש במשקפי מגן עם אטימה מהצד לפי תקן (EN-166).

סכנות לסביבה:

- החומר מזיק לסביבה ורעיל לדגים ולבעלי חיים שוכני מקווי מים.
- אין לרסס סמוך למקווי מים כלשהם.
- יש להיזהר לבל יגיעו טיפות התרסיס או מי שטיפת המרסס למקווי מים.
- אינו רעיל לדבורים.

אופן היישום:

| הגידול | המטרה | הריכוז ב-% | הריכוז בחלקי מיליון (mpp) | הערות |
|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------|--|
| תפוח בזנים גאליה, וסטרקנינג (סטרק) | דילול פרי והגדלת פרי | 0.5% (500 סמ"ק ל-100 ליטר מים) בשילוב משטח טריטון X 100 בריכוז 0.025% | 100 | מרססים במועד שיא פריחה + 10-14 יום. |
| בזן: זהוב | | | | בזן זהוב יש לרסס לאחר ריסוס בתכשיר NAD (דילאמיד / אמיד-תין) |
| אגס בזנים ספדונה וקוסציה | הגדלת הפרי | 0.25% (250 סמ"ק ל-100 ליטר מים) | 50 | יש להוסיף משטח טריטון X-100 בריכוז 0.025%. מרססים במועד שיא פריחה + 10-14 יום. |

List No. 11815-16-01 04-8921/R4

הוראות שימוש:

נפח התרסיס: מרססים בנפח של 100-150 ליטר לדונם, לפי גודל העץ. יש להקפיד ולכסות בתרסיס את כל נפח העץ.

בגמר השימוש:

ניקוי ציוד הריסוס: שטוף היטב את המרסס על כל חלקיו לפני הריסוס ולאחריו. רצוי לשטוף בתמיסה של דטרגנט נוזלי בריכוז 0.05%. יש להקפיד ששאריות התרסיס או מי השטיפה לא יזהמו שדות מעובדים, בריכות דגים ומקורות מים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר השימוש: רחץ היטב את הכפפות לפני הסרתן. רחץ היטב ידיים ופנים בסבון לאחר הטיפול בחומר. כבס את הבגדים היטב בנפרד מכביסה רגילה לפני לבישה חוזרת.

מועד כניסה מחדש (RE-ENTRY): ניתן להיכנס לשטח המרוסס 12 שעות מהריסוס.

אחסון: שמור על האריזה סגורה היטב. אחסן במקום נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, הרחק ממקורות חום ואש. רחוק ממגע של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים.

טיפול בתכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך, שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

טיפול באריות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה:

במקרה מגע עם **העיניים** יש לשטוף במים זורמים במשך כ-15 דקות. במקרה של **בליעה** או במקרה של **הרעלה** יש לפנות לרופא, ולהציג בפניו תווית זאת.

מידע לרופא:

הטלפון של המרכז למידע בהרעלות בבי"ח רמב"ם הוא: 04-7771900

עזור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה. קרא את התווית כולה בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.

עדכון תווית: 11/18