



# ATTRIBUT® COMBI

20% WG

## אטרִיבּוּט-קוּמְבִי

### أتریبوت کومبى

500 גרם

תכשיר ברירני להדברת עשבים  
דגניים ועשבים רִע  
בחיטה לאחר הצצה

מכיל:

Propoxycarbazone-sodium 6.75%  
Mesosulfuron-Methyl %4.5  
Mefenpyr-Diethyl (safener) %9  
היתר חומרי דילול והרטבה

IL79736215G



## אטרִיבּוּט-קוּמְבִי 20%® גרגרים רחופים Attribut-Combi® 20% WG أتریبوت کومبى

סיווג: דרוג IV מסוכן מס' או"ם: 3077  
לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי  
ليس للاستعمال المنزلي! للاستعمال الزراعي فقط  
ברישיין האגף להגנת הצומח מס' 08/הצ/1940

اقرأ اللاصقة بتمعن قبل الاستعمال وتأكد من التطبيق حسبها فقط.  
קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה

**אזהרות:** התכשיר מסוכן לאדם ולחיות משק, גורם לגירוי בעור ובעיניים, מסוכן במגע עם העור, בשאיפה ובבליעה.

**אמצעי זהירות:**

יש להשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בעת טיפול בחומרי הדברה.

1. יש להשתמש בחולצה ומכנסי עבודה בעלי שרוולים ארוכים, גרביים, נעלי עבודה סגורות, כפפות גומי דוחות כימיקלים ומים ומשקפי מגן. בעת הטיפול בתכשיר המרוכז יש ללבוש גם מסכת נשימה עם פילטר חלקיקים P2.

2. בעת הטיפול, יש להימנע מבליעה, נשימת הרחף ומגע של החומר עם העור הגלוי והעיניים.

3. אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטיפול. יש לרחוץ ידיים היטב לפני פעולות אלה עם מים וסבון.

**אזהרות לסביבה:** רעיל ליצורים שוכני מים. עלול לגרום לנזק ממושך לסביבה המימית. אין ליישם בקרבת מקורות מים ודרכי ניקוז.



מיוצר ע"י: Bayer CropScience

לידור כימיקלים בע"מ, רח' הנביאים, ת.ד. 116 רמת השרון 4710002  
טלפון מס' 03-7606222

Bayer





**ATTRIBUT® COMBI**  
20% WG

**אטריביוט-קומבי**  
**أتريوت كومبي**

**כללי:** אטריביוט-קומבי פועל כקוטל עשבים קיימים ונקלט דרך השורשים ודרך העלווה של העשב. סימפטומים של ההדברה לא נראים לפני 2-3 שבועות לאחר היישום. יש לדאוג לכיסוי טוב של העשבים בריסוס. את העשבים הדגניים יש לרסס מעלה ראשון ועד הופעת סעיף שני. עשבים רחבי עלים יש לרסס לפני שקוטר העשב מגיע ל- 5 ס"מ. הדברה אופטימלית מושגת כאשר הקרקע לחה דיה לגידול נמרץ של העשבים. העשבים המודברים הם: **דגניים שונים:** מיני חפורית (מוזרה, מצוייה, קטנה, הפקעים), שיבולת שועל וברומית הגות. **ר"ע:** חלמית, חרדל השדה, מרור הגינה וטוריים.

#### **הוראות שימוש:**

**אזהרות:** התכשיר מסוכן לאדם ולחיות משק, גורם לגירוי בעור, מסוכן במגע עם העור, בשאיפה ובבליעה, מגרה עיניים.  
**אמצעי זהירות:** יש להשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בעת טיפול בחומרי הדברה.

- יש להשתמש בחולצה ומכנסי עבודה בעלי שרוולים ארוכים, גרביים, נעלי עבודה סגורות, כפפות גומי דוחות כימיקלים ומים, משקפי מגן, גרביים ונעלים סגורות. בעת הטיפול בתכשיר המרוכז יש ללבוש גם מסכת נשימה עם פילטר חלקיקים P2.
- בעת הטיפול יש להימנע מבליעה, נשימת הרחף ומגע של החומר עם העור הגלוי והעיניים.
- אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטיפול. לפני פעולות אלה יש לרחוץ ידיים היטב עם מים וסבון.

**אזהרות לסביבה:** רעיל ליצורים שוכני מים. עלול לגרום לנזק ממושך לסביבה המימית. אין ליישם בקרבת מקורות מים ודרכי ניקוז.  
**אמצעי זהירות בעת הריסוס:** אין לרסס כאשר יש רוח. מנע רחף של התרסיס לשדות ולגידולי תרבות שכנים, לבריכות דגים, לנחלים ולמאגרי מים. אין לרסס על חיטה הסובלת מתנאי עקה כלשהם כגון: יובש, קרה, מים עומדים, או עקה אחרת כלשהי. במקרים שבהם החיטה עברה עקת יובש (או כל עקה אחרת) גם אם נראה כי החיטה לכאורה כבר לא סובלת מהעקה אין לרסס את התכשיר.

בעקבות הריסוס עלולים להופיע סימני החוורה ועיכוב בחיטה. סימנים אלה נעלמים בדרך כלל בחלוף 4-6 שבועות.



**ATTRIBUT® COMBI**  
20% WG

**אטריביוט-קומבי**  
أتریبوت کومبی

#### הכנת התרסיס:

1. ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים.
2. שמים את הכמות הדרושה של הגרגרים הרחיפים לתוך המסננת שבפתח המיכל. מפעילים את המערבל ושוטפים את אבקת התכשיר לתוך המיכל על ידי הוספת יתרת המים. אין להפסיק את פעולת מערכת הערבול מעת המילוי ועד גמר הריסוס. במרססים בהם אין מערבול אוטומטי יש לדאוג לערבוב יסודי של תמיסת הריסוס עם תום המילוי.
3. יש להקפיד בעת ריסוס אטריביוט-קומבי להשתמש בצידוד המתאים לריסוס בקוטלי עשבים. הצידוד חייב להיות במצב תקין ומכוייל.

**אופן השימוש:** לשימוש יחיד בשנה. יש להמנע מרחף בגידולים שכנים.

הגידול	מינון	נפח תרסיס	מועד טיפול	הערות
חיטה*	15 ג'/ד'	30 - 10 ל'/ד'	<u>לאחר הצצה</u> - 6 - 2 עלים	חובה להוסיף משטח לא יוני לתרסיס**.

\* רשימת זני חיטה מותרים לריסוס: גליל, גדרה, רם, יבל, זהיר, אריאל, בית השיטה (אין ליישם את התכשיר בזן בית השיטה באיזורי גידול בעלי סף משקעים של 300 מ"מ ומטה).

\*\* משטחים שנבדקו: סיבה, שטח 90, תפ ו-DX על פי הוראות היצרן.

**שילובים:** על מנת להרחיב את טווח הדברת העשבים מומלץ לשלב עם התכשירים הבאים: ברומוטריל 100 סמ"ק/ד' או דרבי 4 סמ"ק/ד' או ברומוטריל 100 סמ"ק/ד'+קוורץ 20 סמ"ק/ד' (בזנים אריאל וגליל בלבד).

**עמידות:** באזורים שונים בארץ התגלו אוכלוסיות של מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות לתכשירים מעכבי ALS. בשדות כאמור יש להקפיד ולנקוט באמצעים המכוונים להתמודד עם בעיית העמידות כמפורט בהמלצות ובפדי ההדרכה. בכל מקרה שיש חשד לקיומם של מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות כאמור, יש להשתמש בקוטלי עשבים אחרים עם מנגנון פעולה שונה מתכשיר זה.



**ATTRIBUT® COMBI**  
20% WG

**אטריביוט-קומבי**  
أتريوت كومبي

**גידולים עוקבים במחזור:** יש להקפיד על זריעת/שתילת גידולים עוקבים בהתאם להנחיות התווית. אטריביוט קומבי בתנאים מסויימים עלול להותיר בקרקע שאריות בנות משמעות לגידולים עוקבים במחזור. שאריותו של אטריביוט קומבי גדולה יותר בקרקעות בסיסיות (pH 7.5 ומעלה), עניות בחומר אורגני, באיזורים מעוטי משקעים ובמיוחד בשנים שחונות. בשלב זה, בהעדר מידע מספק, אטריביוט קומבי מוגבל לשימוש אך ורק בשטחי חיטה המיועדים להיזרע בגידולים המופיעים בטבלה ובהתאם למינימום כמות משקעים שרשומים ממועד ריסוס התכשיר.

אזור	גידול	זמן זריעה/שתילה לאחר ישום אטריביוט קומבי	סף משקעים לאחר הריסוס (ממועד הריסוס ועד זריעת גידול עוקב)
מרכז וצפון הארץ	אבטיח מללי כותנה (אקלפי, גולית)	3.5 חודשים	מעל 400 מ"מ
	חימצה חיטה	שנה	
	תירס תחמיץ (סיימון, ויאני, W-99) תירס מתוק (רויאלטי, אמפייר, אליסה) תירס פופקורן (618)	3.5 חודשים	
דרום הארץ: עד קו סעד במערב ודורות בצפון מזרח	אבטיח מללי	שנה	לפחות 250-300 מ"מ או יותר
	חימצה		
	תלתן		
	תפוא"א		
	חיטה		

אין לזרוע גידולים עוקבים אחרים במחזור אלא משחלפו 20 חודשים ממועד הריסוס וירדו לפחות 400 מ"מ גשם בחודשי החורף שלאחר מועד הריסוס ועד לזריעת הגידול המתוכנן במחזור הפלחה. בחלוף הזמן הנקוב, חובה לעבד את השדה בחריש או בדיסק מעמיק בטרם יזרע הגידול העוקב במחזור. (לבריורים ולקבלת ייעוץ מקצועי, יש לפנות אל משרדי חברת ליזור).

עדכון תווית 07.2014



**ATTRIBUT® COMBI**  
20% WG

**אטריביוט-קומבי**  
**أتريوت كومبي**

#### **בגמר השימוש:**

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי מים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, איזוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

#### **הגנה אישית בגמר העבודה:**

מיד עם גמר הטיפול יש לרחוץ היטב את הגוף, בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט. **מועד כניסה מחדש:** הכניסה לשטח מרסס מותרת 24 שעות לאחר גמר הריסוס.

**איחסון:** יש לשמור את התכשיר באריזה המקורית סגורה היטב במקום סגור ונעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, הרחק ממוצרי מזון ומספוא ומהישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. **טיפול באריות ריקות:** שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת מוסדר.

**חומר שנשפך:** יש לאסוף בכלי אטום תכשיר שנשפך ולהעבירו לאתר פסולת רעילה.

**עזרה ראשונה:** במקרה של הרעלה כתוצאה משימוש בלתי נכון בתכשיר, יש להשכיב את הנפגע במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה מיידית על ידי רופא. אין סימני הרעלה ספציפיים לתכשיר, יתכנו בחילה והקאות. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, יש להפשיט את הבגדים ולשטוף היטב את המקום הנגוע במים וסבון. במקרה של זיהום העיניים יש לשטוף במים זורמים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. יש להביא את תווית התכשיר לרופא המטפל.

**מידע לרופא:** מרכז המידע בהרעלות, בית חולים רמב"ם טלפון מס' 04-8541900.

**תנאי מכירה:** אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשה בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו. בשטחים עם אוכלוסיית מיני עשבים שפיתחו עמידות או סבילות, היצרן/או המשווק לא יישאו באחריות כל שהיא לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהדברה לא מספקת, כיוון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות והתפשטותה.



**ATTRIBUT COMBI**

20% WG

**אטרביוט-קומבי**

אטרביוט קומבי

**500 גרם**

**תכשיר ברירני להדברת עשבים  
דגניים ועשבים רִע  
בחיטה לאחר הצצה**

**מכיל:**

Propoxycarbazone-sodium 6.75%

Mesosulfuron-Methyl %4.5

Mefenpyr-Diethyl (safener) %9

היתר חומרי דילול והרטבה



**אטרביוט-קומבי 20%  
גרגרים רחופים  
Attribut-Combi® 20% WG  
אטרביוט קומבי**

סיווג: דרוג IV מסוכן מס' או"ם: 3077

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי

ليس للاستعمال المنزلي! للاستعمال الزراعي فقط

ברישיון האגף להגנת הצומח מס' 1940/הצ/08

اقرأ اللاصقة بتمعن قبل الاستعمال وتأكد من التطبيق حسبها فقط.  
קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה

**אזהרות:** התכשיר מסוכן לאדם ולחיות משק, גורם לגירוי בעור ובעיניים, מסוכן במגע עם העור, בשאיפה ובבליעה.

**אמצעי זהירות:**

יש להשתמש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בעת טיפול בחומרי הדברה.

1. יש להשתמש בחולצה ומכנסי עבודה בעלי שרוולים ארוכים, גרביים, נעלי עבודה סגורות, כפפות גומי דוחות כימיקלים ומים ומשקפי מגן. בעת הטיפול בתכשיר המרוכז יש ללבוש גם מסכת נשימה עם פילטר חלקיקים P2.

2. בעת הטיפול, יש להימנע מבליעה, נשימת הרחף ומגע של החומר עם העור הגלוי והעיניים.

3. אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטיפול. יש לרחוץ ידיים היטב לפני פעולות אלה עם מים וסבון.

**אזהרות לסביבה:** רעיל ליצורים שוכני מים. עלול לגרום לנזק ממושך לסביבה המימית. אין ליישם בקרבת מקורות מים ודרכי ניקוז.



**מיוצר ע"י:** Bayer CropScience

לידור כימיקלים בע"מ, רח' הנביאים, ת.ד. 116 רמת השרון 4710002  
טלפון מס' 03-7606222

**Bayer**

Attribut Combi / ISRAEL  
1-Kg- Booklet Repeated Page (Booklet Base) (242x150mm)

<b>Bayer CropScience Cyprus Office</b>	<b>Created by : A. Mahmoud</b>
Date : 16.04.2015 Dimensions: 242x150 mm	<b>Code Files for Server : 79736215G</b> <b>File reference : IL. 79736215G(242x150mm)</b> <b>Loaded by: A. Mahmoud</b>
<b>Finish - File</b>	<b>Illustrator CS6</b> <b>CMYK</b>