

# דיפקור

ديبكور DIFKUR

## להדברת מחלות עלים בירקות, גידולי שדה, מטעים ובפרחים תרכיז מתחלב

מכיל 250 גרם בליטר Difenoconazole  
מס' הרישיון של השירותים להגנת הצומח: 4124/הצ/14  
מס' או"ם 3082 | דרגת רעילות: מסוכן IV

**לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!**  
**للاستعمال الزراعي فقط، وليس للاستعمال المنزلي!**

מיוצר ע"י חברת Globachem, Belgium  
מיובא ומשווק ע"י אגרולב כימיקלים, המחלקה החקלאית  
אלתרמן 27, רעננה | טלפון: 09-7601510 | פקס: 09-7461498

אגרולב  
Agrolev  
Chemicals Ltd. כימיקלים בע"מ

[www.agrolev.co.il](http://www.agrolev.co.il)

תכולה: 5 ליטר

עדכון תווית: 1/2014

## בגמר השימוש

**ניקוי המרסס:** בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל משאריות התרסיס בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ובדטרגנט. יש לסלק את התשטיפים בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים כמפורט להלן.

**סילוק תשטיפים:** אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

**הגנה אישית בתום העבודה:** עם גמר הטיפול, יש להתרחץ היטב ולשלוח את הבגדים לכביסה בנפרד.

**כניסה מחדש לשטח שטופל:** ניתן להיכנס מחדש לשטח שטופל עם התייבשות מלאה של התרסיס. בבתי צמיחה ומנהרות יש לאורר היטב בשיטות המקובלות במשך זמן נוסף של 12 שעות לפני כניסה מחדש של עובדים, בכניסה מחדש לשטח שטופל דרושה לפחות לבישת בגדי עבודה גבוהים ונעליים.

**אחסון:** יש לאחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשד.

**חומר שנשפך:** יש לפזר עליו חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

**טיפול בארזות ריקות:** יש לשטוף את הארזיה היטב, לפחות 3 פעמים או במיתקן שטיפה בלחץ מים. יש לשפוך את התשטיפי אל מיכל המרסס, לנקב ולמעוך את הארזיה השטופה ולהשליך אותה במקום המיועד לכך.

**עזרה ראשונה:** במקרה של בליעה, יש להוציא את הנפגע לאוויר הצח ולהשכיב אותו במקום מוצל ומאוורר. יש לדאוג לקבלת עזרה רפואית מיידית, יש להציג לרופא תווית זו. במקרה של מגע התכשיר בעיניים, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות לפחות ולפנות לרופא ולהציג לפניו תווית זו. במקרה של מגע בעור, יש לרוחץ במים ובסבון את האזור שנפגע.

**מידע לרופא:** מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב"ם 04-8541900

**כללי:** דיפקור הוא קוטל מחלות סיסטמי המיועד להדברה של חלפת ומחלות נוף אחרות בנידולי שדה, מטע וירקות

**זהירות:** התכשיר עלול לגרום לגירוי בעיניים ובעור התכשיר עלול לגרום נזק לריאות בבליעה.

**אמצעי זהירות ומיגון:** יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים בעת השימוש בתכשיר בהתאם לכלי הזהירות הנהוגים בשימוש בחומרי הדברה. בעת הטיפול בתכשיר יש להימנע מבליעת התכשיר, מנשימת הרחף וממגע ישיר של התכשיר עם אברי הגוף והבגדים. יש ללבוש סרבל מלא, ככפות גומי מסוג CE או סוג מקביל, משקפי מגן מסיכה תיקנית להגנה על דרכי הנשימה עם מסנן משולב A2P3. אין לשתות, לאכול או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

**סכנה לסביבה:** התכשיר בעל השפעה ארוכת טווח לסביבה המימית. התכשיר רעיל ליצורים שוכני מים. יש להימנע מהגעת התכשיר או תרסיס למקורות מים או בריכות דגים.

## הוראות השימוש:

**אופן הכנת התרסיס:** יש למלא את מיכל המרסס במים עד מיחצתו, להפעיל את המערבל, לנער היטב את מיכל התכשיר ואז לשים את כמות התכשיר הדרושה ולמלא את שארית המיכל תוך כדי ערבול.

הגידול	המחלה	מינון אחוז מנפה או סמ"ק/דונם	מועד אחרון לטיפול ימים לפני קטיף	הערות
תפוח אדמה	חלפת	75	14	
שום	כימסון השקעים (סטמפיליום)	75	30	
בצל	כימסון השקעים (סטמפיליום)	75	30	
עגבנייה	עובש עלים קיימחנית	100	7	רסס מדי 7-14 ימים לפי עוצמת הנגיעות
אפרסק נקטרינה	קימחון האפרסק	0.02%	20	בסוף פריחה רסס 2 ריסוסים מדי שבועיים להדברת קימחון בפרי בחודשים יוני - אוגוסט רסס להדברת קימחון בעלוה