



לפתיחה



מוסתי צמיחה GROWTH REGULATOR



קבוצה: 0

אגרי-גיב מוסת צמיחה בתוארית נוזלית לגפן, הדורים, אגס, אפרסמון, פרחים, קינרס וכרפס.

מכיל: 33 גרם חומצה ג'ברלית (GA3) בליטר (4% משקלי)

דרגת רעילות: מסוכן (IV). מס' או"ם: 1219
רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 4430/הצ/17
קרא בעיון את התווית לפני השימוש

מס' אצווה ותאריך ייצור יכולים להופיע בכל מקום על התווית או על האריזה.
Batch number and production date can be printed anywhere on the label or packaging.

מיוצר ע"י ד"ר מירון חרושת כימית
בעל הרשיון והמשווק: כצט בע"מ
משרד ראשי: החרש 4, הוד השרון, 45240
טל. 09-7626257, פקס. 09-7626327



לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي



דליק

1 ליטר

אגרי-גיב 4 ת"נ

أجريجيب Agri-Gibb® 4 SL

תרכיז נוזלי
Soluble Liquid

מוסת צמיחה



הגידול	מטרה	מועד הטיפולים	ריכוז בחלקי מליון	סמ"ק תכשיר ל-100 ליטר מים	נפח התרסיס	משטח
ענבים: פרלט סולטנינה תמר בירותי	דילול האשכולות והגדלת הגרגר	1. ב-100%-90% פריחה 2. בגמר חנטה עד 7 ימים לאחר מכן	20-15 40-30	60-45 120-90	הרטבה מלאה	BB-5 בריכוז 0.15% - 0.2% או טריטון x-100 בריכוז 0.025%
		1. ב-80%-50% פריחה 2. בפריחה מלאה 3. לאחר גמר חנטה * (1)	20-15 30 40-30	60-45 90 120-90		
	הגדלה ניכרת של הגרגר	טבילת האשכול כאשר הגרגרים הגיעו לגודל של אפונה	20	60	הערות: יש להימנע מריסוס הנוף	
הדרים: ולנסיה ושינגטון	צמצום קמטת ("פארוש")	בחדש יולי	20	60	10-15 ליטר לעץ	BB-5 בריכוז 0.15% לבד או טריטון B 0.025% בתוספת 0.1% חומצה זרחתית או בתוספת אוראה פוספט 50 בריכוז 0.4%
קלמטניה אור נובה, טופז מיניאולה	הגברת חנטה	ריסוס במלוא הפריחה ועד שלב חנטים	25	75	10-15 ליטר לעץ	טריטון B 0.05% או נוטרקס 0.025%
מיניאולה, אשכולית, פומלית	הארכת עונת הקטיף* (2)	אוקטובר	5	15	500 ליטר לדונם	BB-5 בריכוז 0.15%
אשכולית, פומלו פומלית	שמירת פרי באיסוס	טיפול במערך בית אריזה, משולב בתוך הדונג	50	300 סמ"ק לחבית דונג של 200 ליטר		
אגס מגיל 4 ומעלה	הגברת חנטה * (3)	בתחילת פריחה מלאה	15-30	45-90	100-50 ליטר לדונם בהתאם לגודל העץ	טריטון x-100 בריכוז 0.025%
אפרסמון (בזן טריומף)	הפחתת נשירת חנטים	בשיא הפריחה - תחילת חנטה	30	90	עד נגירה	טריטון x-100 בריכוז 0.025%
		סוף אוקטובר - תחילת נובמבר	50	150		
קינרס הזן: סגול בהיר הזן: ירוק	הקדמת היבול	1. ראשית אוקטובר 2. 21 יום אחר הריסוס הראשון	30	90	הרטבה מלאה	לרסס אחר השקיה. אין לרסס חלקות שאינן בהתפתחות תקינה, משובשות בעשבים או חולות.
		ראשון ב-5 עד 10 בספטמבר ואחריו עוד 2 ריסוסים בהפרש של 3 שבועות	120	360		
כרפס הזנים: פלורידה, יוטה 96-1	הגברת היבול של חלקות שתאספנה בחדשים פברואר-אפריל בלבד	5 שבועות לפני מועד האסיף המשוער	30	90	70 ליטר לדונם	
כלנית	הארכת הגבעול	3-4 ריסוסים החל מ: 3-4 שבועות לפני הפריחה	15-30	45-90	הרטבה מלאה	
אירוס הולנדי	האפלת הפריחה ב- 10 ימים והארכת הגבעול בכ- 4 ס"מ	סמוך לשתילה		1. 500 (אחרי קרוור רגיל למשך 24 ש') 2. 1000 (אחרי קרוור רגיל למשך שעה)	טבילה	
גיבסנית	הארכת הגבעול	ריסוס ראשון יינתן בשלב של הופעת ענפי צד באורך 5-7 ס"מ. ריסוסים נוספים מדי 7-14 יום עד לשלב של ענפי פריחה בגובה 30-40 ס"מ.	250-500	750-1500	כדי הרטבת מרכז הצמח	BB-5 בריכוז 0.15%

שילובים: בהדרים ניתן לשלב עם נירון ת"מ. | הוספת משטחים תיעשה כמפורט בטבלת הוראות השימוש.

עידכון תווית: 08/17 * (1) לאחר מכן 2-3 ריסוסים נוספים במרווח של 4-6 ימים. * (2) ריסוסים בסתיו עלולים לעתים להפחית במידת מה את הפריחה והיבול בשנה העוקבת. * (3) יש לכוון את הריסוס לאזורי העץ הפורחים. מרססים בעצים שצמיחתם טובה מגיל 4 ומעלה.

אזהרות:

- מסוכן בבליעה.
- דליק מאד.
- גורם לבזק משמעותי לעיניים.
- אדי החומר עלולים לגרום לסחרחורת ונמנום.

אמצעי זהירות ומיגון:

- יש להשתמש באגרי-גיב נוזלי בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בשימוש בחומרי הדברה.
- יש להמנע מבליעת התכשיר ומשאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.
- לבש בגדי עבודה ארוכים, חבוש כובע ונעל נעליים גבוהות.
- לבש ככפות גומי לפי תקן 374/3, ומשקפי מגן לפי תקן EN-166 מסכת חצי פנים לפי תקן EN-140 עם מסנן EN-14387 מסוג ABEK-P3.

סכנות לסביבה:

רעילות נמוכה לדבורים.

הוראות שימוש:

- מלא את מיכל המרסס במחצית כמות המים הדרושה.
- הפעל את המערבל, הוסף בהדרגה את כמות התכשיר הדרושה ולאחריו את המשטח והשלם את יתרת המים תוך ערבול מתמיד.
- הוסף משטח רק באותם מקרים בהם הדבר צויין בהוראות שימוש.
- שמור על ערבול מתמיד בזמן הריסוס. אל תשהה את התרסיס במיכל ללא ערבוב.
- אין להשאיר תרסיס במיכל יותר מאשר 12 שעות.

בגמר השימוש:

- ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשארייות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
- סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק

- תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
- איחסון: אחסן במקום נעול קריר ויבש המתאים לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים, אנשים בלתי מוסמכים ובעלי חיים, הרחק ממזונות האדם והחיה.
- תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לספוג בנסורת או בחול לאסוף לכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה. תכשיר שפג תוקפו או שהתקלקל בזמן האחסון הינו כפסולת מסוכנת וחייב בפינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
- טיפול באריזות ריקות: שטוף את האריזה היטב, לפחות 3 פעמים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ אל מיכל המרסס נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למיכל האשפה או לאתר פסולת שאישר השר לאיכות הסביבה.

הגנה אישית בגמר העבודה:

- לאחר הריסוס ולפני אכילה, שתיה ועישון, רחץ היטב את ידיך וגופך במים חמים וסבון והחלף את כל בגדיך. החלף את הבגדים המזוהמים וכבס אותם במים ובסבון לאחר שעברו ניטרול בתמיסת סודה לכביסה 10%. אל תלבש מחדש בגדים שלא כובסו. לעבודה יש ללבוש בגדים לאחר כביסה בלבד, יש לכבס את הבגדים בנפרד מכביסה רגילה.
- הרחק מהישג ידם של ילדים. הרחק ממזון, שתיה ומזון בע"ח.

מועד כניסה מחדש (REENTRY):

- ניתן להכנס לשטח מיד עם סיום הריסוס.
- יש לאוורר בשיטות המקובלות 12 שעות נוספות בבתי צמחיה ובמנהרות עבירות לפני כניסה אחרי הטיפול.

עזרה ראשונה: במקרה מגע עם העיניים יש לשטוף במים זורמים במשך כ-15 דקות. לאחר הריסוס יש לרחוץ היטב את הידיים ושאר חלקי הגוף שנחשפו לתרסיס. במקרה של בליעה יש לפנות לרופא.

מידע לרופא:

מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא: 04-7771900

עצור! שימוש בלתי נכון בכל חומר הדברה עלול להזיק לבריאות ולסביבה. קרא את התווית כולה בתשומת לב ופעל בהתאם להוראות.