

אגאן



קוטלי עשבים

ADAMA
Agan

אלנקס
الانكس Alanex

תרכיז מתחלב
ALACHLOR 480 g/L
השאר חומרי דילול והרטבה

קוטל עשבים בררני להדברת עשבים
חד-שנתיים בגידולים שונים

קבוצת HRAC K

מסי' הרישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת: 78/הגה"צ/948

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!

للاستعمال الزراعي فقط - وليس للاستعمال المنزلي!

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם 04-8541900

קרא את התווית לפני השימוש ו מספר אצווה מודפס על גבי האריזה

ייצור ושיווק: אדמה-אגן בע"מ

אשדוד 77102, ת.ד. 262, טל. 08-8515211

www.adama.com/agan

10 ליטר

עידכון 12/14 50400-10



סרוק לכניסה לאתר



דליק

בגמר השימוש

ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.

סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן הריסוס, ממכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כגון ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.

הגנה אישית בגמר העבודה:

ידיים וחלקי גוף חשופים שבאו במגע עם החומר צריך לרחוץ במים נקיים וסבון. יש לכבס בגדי עבודה בנפרד מכביסה רגילה. אין ללבוש בגדים לא מכובסים.

כניסה לשטח המרסס: לאחר התייבשות התרסיס.

אחסון:

אחסן אלנקס במקום נעול, מוצל ויבש המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. היזהר לבל יבוא החומר במגע עם חומרי מזון, מספוא, זרעים ותכשירי הדברה אחרים. שמור את החומר באריזה המקורית, סגורה היטב.

חומר שנשפך:

צריך לשפוך עליו חול כדי לספגו, לאסוף בכלי אטום ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

טיפול באריזות ריקות:

את האריזות הריקות צריך לשטוף 3 פעמים במים או במתקן שטיפה בלחץ מים. שפוך את התשטיפ לתוך מכל המרסס. נקב ומעך את האריזה השטופה והשלך אותה למכל האשפה או לאתר פסולת רעילה.

עזרה ראשונה:

במקרה של מגע התרסיס **בעיניים**, שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא. במקרה של **בליעה** פנה את הנפגע לרופא והצג לפניו תווית זו.

מידע לרופא: המרכז הארצי למידע בהרעלות ביה"ח רמב"ם 04-8541900

אלאנקס אלנקס ALANEX

תנאי מכירה: היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו אולם מאחר שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן שימוש אחר.

אלאנקס הנו קוטל עשבים המונע הצצת עשבים חד-שנתיים ממשפחת הדגניים כגון דוחנית השלחין, אצבען מאדים, זיפן ועוד, ורחבי עלים כגון כף אווז, רגלת הגינה, בר גביע, ירבוז, ענבי שועל ועוד.

אזהרות: עלול לגרום לכירוי העור והעיניים. התכשיר דליק. הרחק ממקורות אש. אסור לעשן או לאכול בזמן הטיפול בתכשיר. השימוש בתכשיר עלול להזיק לבריאותך, התכשיר מכיל Alachlor אשר לגביו נקבע שהוא גורם לגידולים בחיות מעבדה.

אמצעי זהירות ומיגון: בעת הטיפול בתכשיר המרוכז ובתרסיס לבש מגן פנים או משקפי מגן וכפפות גומי. מנע מגע התכשיר והתרסיס בחלקי גוף חשופים ובעיניים. הימנע מלהימצא בענן התרסיס. אסור לאכול או לעשן בזמן הטיפול בתכשיר.

סכנות לסיכיה: אלאנקס רעיל לדגים. הימנע מרחף לבריכות דגים ומקורות מים.

אזהרות למי תהום (אסור להשתמש בתכשיר):

- מגבולה אצפוני של רצועת עזה עד דרום אשדוד, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ ממזרח לקו הים.
 - מאשדוד עד קיסריה, בחלקות הנמצאות עד 8 ק"מ מזרחה מקו הים.
 - מחיפה-קרית עד עכו, בחלקות הנמצאות עד 3 ק"מ מזרחה מקו הים.
- לא כלולות באיסור זה חלקות בהן: שיעור החרסית בקרקע הוא 15% ויותר או שיעור החומר האורגני בקרקע הוא 1% או יותר.

הערות לטיפול: מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים. אין לרסס בתנאי מזג אוויר קיצוניים כגון קרה או שרב או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנזקי קרה, מחוסר אוורור קרקע או מנזק מקוטלי עשבים ועוד.

הפעלת התכשיר: אלאנקס ימנע הצצת עשבים לאחר הפעלתו ע"י גשם או המטרה. בטיפול קדם הצצה אפשר להמתין להפעלתו עד 7 ימים. בטיפולים לאחר הצצת הגידול חייבים להמטיר תוך 2-3 שעות. אין להמטיר יותר מ-50 מ"ק לדונם.

שילובים בטיפול קדם הצצה: ניתן לשלב אלאנקס עם טרבوترקס, אטרנקס או ראונדאפ/גלייפוגן (בשדות המשובשים בנבטי עשבים) בהתאם לרישוי של התכשיר המשובל.

הכנת התרסיס: מלא את מכל הריסוס עד חציו במים. הפעל את מערבול המרסס ושפוך את הכמות הדרושה של אלאנקס לתוך המכל תוך השלמת כמות המים החסרה. כאשר מערבבים אלאנקס עם אבקות רטיבות צריך למהול את האבקה הרטיבה בכלי נפרד עם מים, לבחוש היטב עד קבלת עיסה אחידה ולהכניס תוך בחישה למכל המרסס לפני הוספת אלאנקס.

הציוד וכיולו: בריסוס אלאנקס צריך להשתמש במרסס ללא מפוח, המצויד במערבל ובמוט ריסוס עם פומיות מניפה. בעת הכנת החומר במכל המרסס ובזמן הריסוס מקפידים על ערבול תמידי של התרסיס במכל. השתמש בכל המערכת במסננים בני 50 שילובים (מש) כולל מסנני הפומיות. לקבלת המינון הדרוש ולשם דיוק הביצוע הקפד על כיול מדויק של המרסס לפני הטיפול. במשך כל פעולת הריסוס צריך להימנע מחפיפות, מעצירות, מהאטה, מזילות וכיו"ב.

הוראות שימוש

אלאנקס ימנע הצצת עשבים לתקופה של כחודשיים לאחר הפעלתו. אלאנקס ימנע הצצת נבטים של דורת ארם-צובא (קוסאב), התכשיר אינו מדביר עשבים לאחר הצצתם. ניתן להשתמש באלאנקס בריסוס מהקרקע בלבד בגידולים המפורטים בטבלה:

הגידול	מועד הטיפול	המינון (סמ"ק/ד')	נפח התרסיס (ל'/ד')	הערות
אגוזי-אדמה	1) לאחר הזריעה לפני הצצת הגידול	400-500	20 - 30	ניתן לשילוב עם טרבوترקס, במקרה זה משתמשים במינון הנמוך
	2) בזמן הגידול	400	20 - 30	על שטח נקי מעשבים (ראה סעיף הפעלה)
תירס מתוק תירס למספוא	לאחר הזריעה לפני הצצת הגידול	בקרקע קלה ובינונית 300 בקרקע כבדה 400	20 - 30	בשילוב עם אטרנקס
חמנייה לפיצוח	לפני או אחרי הזריעה	400	20 - 30	ניתן לשילוב עם טרבوترקס, בטיפול קדם הצצה.
כותנה לסיכים בעמק החולה בלבד	לאחר הזריעה, לפני הצצת הגידול	500	20 - 30	הטיפול מיועד לאדמות בעלות תכולה מעל ל-5% חומר אורגני בעמק החולה. בקרקעות בעלות תכולה נמוכה של חומר אורגני עלול החומר לגרום למק לכותנה.

אלאנקס אלכסיס ALANEX

אלאנקס אלכסיס ALANEX



ADAMA

Agan

אלנקס
Alanex الانكس

תרכיז מתחלב
ALACHLOR 480 g/L
השאר חומרי דילול והרטבה

קוטל עשבים בררני להדברת עשבים
חד-שנתיים בכידולים שונים

www.adama.com/agan

L0400C-09 8/14 עידכון

10X2 ליטר

אלנקס
الانكس
Alanex